



SU
GUÍA
DE TRATAMIENTO CON RINVOQ

abbvie
contigo

UNA EXPERIENCIA DE APOYO
CON RECURSOS DISEÑADOS CONTIGO EN MENTE

Vea la [Información de Seguridad Importante](#) en las páginas 12-14.
Vea la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#),
en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analicela con su médico.

 **RINVOQ**[®]
upadacitinib



USO¹

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con artritis psoriásica activa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis psoriásica.

Consideraciones de seguridad¹

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, cuando se usa RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves.** No tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a alguno de sus ingredientes.
- **Desgarres en el estómago o los intestinos y cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Vea la [Información de Seguridad Importante en las páginas 12-14.](#)

Vea la [Información de Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento,](#) en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analicela con su médico.



SU MÉDICO LE HA RECETADO RINVOQ PARA LA ARTRITIS PSORIÁSICA

Es probable que tenga preguntas. No es para menos. La artritis psoriásica (APs) es una enfermedad compleja, y comenzar un tratamiento nuevo puede parecer abrumador a menudo. Mientras más conozca acerca de su plan de tratamiento recetado, mejor preparado se sentirá para seguirlo.

- ☛ Sobre RINVOQ
- ☛ Recursos de AbbVie Contigo
- ☛ Entendiendo su enfermedad
- ☛ ¿Quién corre riesgo de padecer de artritis psoriásica?
- ☛ Los síntomas de artritis psoriásica
- ☛ Cómo su sistema inmunitario desencadena la inflamación
- ☛ Cómo RINVOQ trabaja en su cuerpo
- ☛ Uso e Información Importante de Seguridad

**¿TIENE ALGUNA
PREGUNTA?**

Lea este folleto detenidamente, y asegúrese de conversar sobre cualquier pregunta que tenga con su médico.

Vea la [Información de Seguridad Importante](#) en las páginas 12-14.

Vea la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analicela con su médico.



SOBRE RINVOQ

En estudios clínicos, RINVOQ ayudó a:

- Aliviar significativamente el dolor, la hinchazón y la rigidez articular de la APs en 3 meses; los síntomas mejoraron en solo 2 semanas en algunas personas
- Detener un mayor daño articular irreversible
- Aliviar el enrojecimiento, el engrosamiento y las escamas en personas con placas de la piel*
*RINVOQ no está aprobado para tratar la psoriasis en placas.
- Reducir significativamente el cansancio causado por la APs
- Permitir que las tareas diarias fuesen más fáciles de hacer, como abrir la llave del agua, abotonarse una camisa y hacer los quehaceres
- Aliviar la sensibilidad en personas con entesitis (dolor e hinchazón en áreas como el talón y el codo)
- Reducir la hinchazón de los dedos de las manos y los pies en personas con dactilitis (también conocido como “dedos de salchichas”)

USO¹

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con artritis psoriásica activa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis psoriásica.

Consideraciones de seguridad¹

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, cuando se usa RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves.** No tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a alguno de sus ingredientes.
- **Desgarres en el estómago o los intestinos y cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Vea la [Información de Seguridad Importante](#) en las páginas 12-14.

Vea la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analicela con su médico.



LOS RECURSOS

QUE NECESITA CUANDO LOS NECESITA

Usted es único. La APs no lo define a usted ni lo que es importante para usted. Por eso, **AbbVie Contigo** ofrece apoyo personalizado y los recursos que necesita cuando los necesita.



Su Especialista de Cuidado* dedicado de **AbbVie Contigo** está ahí para aprender a conocerlo a usted y sus necesidades, para proveer apoyo personalizado e individualizado en cada paso del camino.



Una tarjeta de Ahorros† de **AbbVie Contigo** que le ayuda a ahorrar en el costo de su receta mes tras mes, de ser elegible.



Especialistas en seguro que pueden ayudarlo a navegar a lo largo del proceso del seguro.



Centro de Llamadas Local



Guía para Establecer Rutina de Tratamiento



Recordatorio de Repetición de Medicamentos y de Nueva Receta



Programa de Educación al Paciente

PARA CONOCER MÁS ACERCA DE LOS RECURSOS DE APOYO DE ABBVIE CONTIGO,

contacte a su Especialista de Cuidado o llame al

1.855.CONTIGO (1.855.266.8446)

Seleccione la opción #3 en el menú para asistencia inmediata a pacientes de RINVOQ (upadacitinib).

*AbbVie provee los Especialistas de Cuidado y estos no trabajan para su profesional del cuidado de la salud (PCS) ni brindan consejo médico. Están adiestrados para dirigir a los pacientes a sus PCS para recibir consejo relacionado al tratamiento, incluidos otros referidos.

†Para pacientes elegibles con seguro comercial solamente. Vea los términos y condiciones en la página 11.

Vea la [Información de Seguridad Importante](#) en las páginas 12-14.

Vea la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analicela con su médico.

ENTENDIENDO

SU ENFERMEDAD

Mientras más conozca acerca de su enfermedad y qué esperar, más fácil será entenderla. Esto también puede ayudar a explicar su experiencia a otros.



La APs es una enfermedad crónica. Esto significa que los síntomas podrían regresar y ser duraderos. Puede causar placas en la piel e inflamación de las articulaciones, los tejidos alrededor de las articulaciones y los huesos. Además, puede limitar su capacidad para llevar a cabo actividades sencillas diarias.



La APs afecta más comúnmente las articulaciones de las puntas de los dedos de las manos o los pies, las muñecas, las rodillas o los tobillos. Muchas personas con APs también tienen psoriasis en placas.



Una combinación de factores. La causa exacta de la APs no se conoce. Se cree que puede ser un resultado de una combinación de factores inmunitarios, genéticos y ambientales.

CERCA DE 1 DE CADA 3 PERSONAS con psoriasis puede desarrollar APs.

A menudo, los síntomas articulares comienzan después de aparecer los síntomas en la piel.

Pero a veces los síntomas articulares se desarrollan antes de los síntomas en la piel.

¿QUIÉN

CORRE RIESGO DE PADECER DE ARTRITIS PSORIÁSICA?

La causa exacta de la APs no se conoce, pero hay factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades. Converse con su médico para conocer más acerca de los posibles factores de riesgo.



Antecedentes familiares

Tener un miembro de la familia con APs aumenta el riesgo de desarrollarla.



Psoriasis

Cerca de 1 de cada 3 personas con psoriasis puede desarrollar APs.



Edad

La APs puede ocurrir a cualquier edad, aunque, por lo general, se desarrolla entre los 30 y los 50 años.



Genética

Las personas nacidas con genes específicos son más propensas a desarrollar APs.

SÍNTOMAS

DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA

Los signos y los síntomas de la APs pueden incluir:

- Dolor, hinchazón y rigidez articular
- Cansancio
- Hinchazón de los dedos de las manos y/o los pies (también conocido como dactilitis, o “dedos de salchichas”)
- Placas en la piel
- Dolor e hinchazón en áreas como el talón y el codo (conocido como “entesitis”)
- Uñas punteadas

Si está experimentando síntomas de APs, haga una cita con un reumatólogo lo antes posible.

CONOZCA LOS HECHOS

La APs puede estar inactiva en el cuerpo hasta que una influencia externa (por ejemplo, una infección) la desencadene.

CÓMO

EL SISTEMA INMUNITARIO DESENCADENA LA INFLAMACIÓN

La conexión entre el sistema inmunitario y la inflamación.

Por lo regular, el sistema inmunitario protege el cuerpo contra las enfermedades atacando bacterias y virus. Pero con la APs, el sistema inmunitario no funciona adecuadamente y ataca los tejidos sanos de su propio cuerpo.

El sistema inmunitario reacciona desproporcionadamente. El cuerpo envía apresuradamente células del sistema inmunitario hacia las articulaciones y la piel que están sanas.


Cinasas de Janus (JAK). Esto provoca una reacción en cadena que causa la activación de otras células y proteínas que participan en la respuesta inflamatoria, como las cinasas de Janus (JAK).

Inflamación. El resultado es inflamación crónica, que causa dolor, rigidez, daño articular permanente y parches de piel rojizos y escamosos conocidos como "placas".*

*RINVOQ no está aprobado para tratar la psoriasis en placas.

Vea la [Información de Seguridad Importante](#) en las páginas 12-14.

Vea la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analicela con su médico.



CÓMO RINVOQ TRABAJA EN SU CUERPO

RINVOQ es un inhibidor de JAK que regula el sistema inmunitario hiperfuncionante para ayudar a detener que se ataque a sí mismo.

RINVOQ trabaja dentro del cuerpo bloqueando señales específicas que se cree que causan inflamación.

MANTÉNGASE AL DÍA CON LAS PRUEBAS DE LABORATORIO

Es importante que se haga sus laboratorios según recomiende su médico.

USO¹

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con artritis psoriásica activa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis psoriásica.

Consideraciones de seguridad¹

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, cuando se usa RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves.** No tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a alguno de sus ingredientes.
- **Desgarres en el estómago o los intestinos y cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

Vea la [Información de Seguridad Importante](#) en las páginas 12-14.

Vea la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analícela con su médico.



¿Quiere ahorrar en el costo de su receta mensual?†

Si usted es elegible, podría pagar tan poco como \$5* al mes todos los meses por su receta de RINVOQ (upadacitinib).

Esta no es una tarjeta física. Mencionele a su farmacia especializada la tarjeta de ahorros de Ahorros Contigo para RINVOQ para que el personal de la farmacia pueda activar este beneficio de forma electrónica en línea a su nombre.


*\$5 por dosis mensual de RINVOQ.

PARA ORIENTACIÓN SOBRE LA TARJETA DE AHORROS DE AHORROS CONTIGO PARA RINVOQ Y PARA INSCRIBIRSE AL PROGRAMA DE ABBVIE CONTIGO PUEDE LLAMAR AL

1.855.CONTIGO
(1.855.266.8446)



SELECCIONE LA OPCIÓN #3



EN EL MENÚ PARA ASISTENCIA INMEDIATA A PACIENTES DE RINVOQ

***Términos y Condiciones aplican.** Este beneficio cubre RINVOQ® (upadacitinib). **Elegibilidad:** Disponible para pacientes que tienen un seguro comercial con una cubierta de medicamentos recetados para RINVOQ y que cumplen con los criterios de elegibilidad. El programa de asistencia en el copago no está disponible para pacientes que reciben reembolso bajo programas de seguro federales, estatales o financiados por el gobierno (por ejemplo, Medicare [incluida la Parte D], Medicare Advantage, Medigap, Medicaid, TRICARE, o programas del Departamento de Defensa o de Asuntos de Veteranos) o donde esté prohibido por la ley o el proveedor de seguro médico del paciente. Si en algún momento, un paciente comienza a recibir cobertura para medicamentos recetados bajo algún programa de salud federal, estatal o financiado por el gobierno, el paciente no podrá usar la tarjeta de ahorros de RINVOQ y el paciente tiene que llamar a AbbVie Contigo al 1.855.CONTIGO para suspender su participación. Los pacientes que residen o reciben tratamiento en ciertos estados puede que no sean elegibles. Los pacientes no pueden solicitar reembolso por el valor recibido por parte del programa AbbVie Contigo de ningún pagador. La oferta está sujeta a cambio o discontinuación sin aviso. Restricciones, incluidos máximos mensuales, pueden aplicar. Esto no es un seguro médico. Para conocer las prácticas de privacidad de AbbVie, así como las opciones de privacidad que usted tiene, visite www.abbvie.com/privacy.html.

Vea la [Información de Seguridad Importante](#) en las páginas 12-14.

Vea la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analicela con su médico.

USO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE acerca de RINVOQ® (upadacitinib)¹

USO¹

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con artritis psoriásica activa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés) se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con artritis psoriásica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE acerca de RINVOQ® (upadacitinib)¹

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de RINVOQ?

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves cuando se usa RINVOQ, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden propagarse por el cuerpo. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones. Su profesional del cuidado de la salud (PCS) debe hacerle pruebas para detectar TB antes de comenzar RINVOQ y vigilarlo de cerca por la posibilidad de signos y síntomas de TB durante el tratamiento de RINVOQ. No debe comenzar a usar RINVOQ si tiene algún tipo de infección a menos que su profesional del cuidado de la salud (PCS) le indique que puede hacerlo. Si adquiere una infección grave, puede que su PCS interrumpa el tratamiento hasta tanto la infección se controle. Puede correr un riesgo mayor de desarrollar culebrilla (herpes zóster).
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca (cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ puede aumentar el riesgo de cánceres específicos. Han ocurrido linfomas y otros cánceres, incluidos cánceres de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de cánceres específicos, incluidos

linfoma y cáncer de pulmón. Siga el consejo de su PCS respecto a verificarse la piel por la posibilidad de cáncer de la piel durante el tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que se expone al sol. Use ropa protectora cuando se exponga al sol y use protector solar.

- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares (CV) importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 50 años y mayores con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca (CV), en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos.** Pueden ocurrir coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias con RINVOQ. Esto puede atentar contra la vida y causar la muerte. Han ocurrido coágulos sanguíneos en las venas de las piernas y los pulmones con más frecuencia en personas de 50 años y mayores y con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca (CV).
- **Reacciones alérgicas.** Se han observado síntomas como erupción (ronchas), dificultad para respirar, sensación de desmayo o mareo, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que pueden indicar que se está presentado una reacción alérgica en personas que toman RINVOQ. Algunas de estas reacciones fueron graves. De ocurrir alguno de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque ayuda de emergencia de inmediato.
- **Desgarres en el estómago o los intestinos y cambios en ciertas pruebas de laboratorio.** Su PCS debe hacer pruebas de sangre antes de comenzar a usar RINVOQ y mientras lo usa. Su PCS puede suspender el tratamiento de RINVOQ por un periodo de tiempo de ser necesario debido a los cambios en estos resultados de las pruebas de sangre.

No tome RINVOQ si:

- **Presenta alergia al upadacitinib o a alguno de los ingredientes de RINVOQ.**

(Continúa en la próxima página)

Vea la **Información de Prescripción** completa, incluida la **Guía del Medicamento**, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analícela con su médico.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

acerca de RINVOQ® (upadacitinib)¹(cont.)

¿Qué debo informarle a mi PCS ANTES de comenzar RINVOQ?

Infórmele a su PCS si:

- Recibe tratamiento para una infección, tiene una infección que no desaparece o recurre, o tiene síntomas de una infección como:
 - Fiebre, sudoración o escalofríos
 - Falta de aliento
 - Piel caliente, rojiza o dolorida o ampollas en el cuerpo
 - Dolores musculares
 - Sensación de cansancio
 - Flema con sangre
 - Diarrea o dolor estomacal
 - Tos
 - Pérdida de peso
 - Ardor al orinar u orinar más frecuente de lo normal
- Tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB.
- Actualmente fuma o ha fumado en el pasado.
- Ha sufrido un ataque cardíaco, otros problemas cardíacos o derrame cerebral.
- Tiene o ha tenido algún tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o intestinos.
- Tiene otros padecimientos, incluidos problemas hepáticos, recuentos bajos de glóbulos sanguíneos, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema inmunológico débil.
- Vive, ha vivido o viajado a lugares del país, como los valles de los ríos Ohio y Misisipí y el suroeste, que aumentan el riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones micóticas. Si no está seguro de haber visitado estos lugares, pregúntele a su PCS.
- Ha recibido recientemente o tiene programado recibir una vacuna. Las personas que toman RINVOQ no deben recibir vacunas atenuadas.

- Está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. Basado en estudios en animales, RINVOQ puede causarle daño al feto. Su PCS verificará si está embarazada antes de comenzar RINVOQ. Debe usar un método para el control del embarazo (anticoncepción) efectivo para evitar el embarazo durante el tratamiento de RINVOQ y por 4 semanas después de su última dosis.
- Está lactando o tiene planes de lactar. RINVOQ puede pasar a la leche materna. No debe amamantar durante el tratamiento de RINVOQ y por 6 días después de su última dosis.

Infórmele a su PCS de todos los medicamentos que usa, incluidos los recetados y los que no requieren receta, vitaminas y suplementos herbarios. RINVOQ y otros medicamentos pueden afectarse unos a los otros y causar efectos secundarios.

En especial, infórmele a su PCS si usa:

- Medicamentos para infecciones micóticas o bacterianas
- Rifampicina o fenitoína
- Medicamentos que afectan el sistema inmunitario

Pregúntele a su PCS o farmacéutico si no está seguro si usa alguno de estos medicamentos.

¿Qué debo hacer o informarle a mi PCS DESPUÉS de comenzar RINVOQ?

- Infórmele a su PCS de inmediato si tiene síntomas de una infección. RINVOQ puede hacerlo más propenso a infecciones o empeorar cualquier infección que tenga.
- Busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta síntomas de ataque cardíaco o derrame cerebral mientras usa RINVOQ, incluidos:
 - Incomodidad en el centro del pecho que dura por más de algunos minutos o que desaparece y recurre
 - Apretamiento severo, dolor, presión u opresión del pecho, garganta, cuello o mandíbula

(Continúa en la próxima página)

Vea la Información de Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analícela con su médico.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

acerca de RINVOQ® (upadacitinib)¹(cont.)

- Dolor o incomodidad de los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
- Falta de aliento con o sin incomodidad del pecho
- Sudoración fría
- Náuseas o vómitos
- Aturdimiento
- Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
- Arrastrar las palabras
- Infórmele a su PCS de inmediato si presenta signos o síntomas de coágulos sanguíneos durante el tratamiento con RINVOQ, incluidos:
 - Hinchazón
 - Dolor o sensibilidad al tacto en una o ambas piernas
 - Dolor repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior de la espalda
 - Falta de aliento o dificultad para respirar
- Infórmele a su PCS de inmediato si presenta fiebre o dolor en el área del estómago que no desaparece, y un cambio en sus hábitos intestinales.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RINVOQ?

Estos incluyen infecciones del tracto respiratorio superior (resfriado común, sinusitis), culebrilla (herpes zóster), infecciones a causa del virus herpes simple (incluidas aftas), bronquitis, náusea, tos, fiebre, acné, dolor de cabeza, aumento en los niveles séricos de creatina fosfoquinasa, reacciones alérgicas, inflamación de los folículos pilosos, dolor en la zona del estómago (abdominal), aumento de peso, influenza, cansancio, recuento bajo de glóbulos blancos específicos (neutropenia, linfopenia), dolor muscular, enfermedad similar a la influenza, erupción, aumento en los niveles de colesterol en la sangre y aumento en el nivel de las enzimas hepáticas.

Ha ocurrido separación o desgarre del revestimiento de la parte trasera del ojo (desprendimiento de la retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame a su PCS de inmediato si presenta algún cambio súbito de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Vea la Información de Prescripción completa, incluida la Guía del Medicamento, en https://www.rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf y analícela con su médico.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de RINVOQ.

¿Cómo debo tomar RINVOQ?

RINVOQ se toma una vez al día con o sin comida. No parta, rompa, triture ni mastique la tableta. Tome RINVOQ exactamente como su PCS se lo indica. RINVOQ está disponible en tabletas de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

Esta es la información más importante que debe conocer acerca de RINVOQ. Para más información, hable con su PCS.

Se le exhorta a informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Acceda a www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Si tiene problemas para pagar por su medicamento, AbbVie podría ayudarle. Acceda a AbbVie.com/myAbbVieAssist para obtener más información.

Referencia: 1. RINVOQ [prospecto del empaque]. North Chicago, IL: AbbVie Inc.



