

# ENFERMEDAD DE CROHN

# GUÍA DE CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO

## Una guía para ayudarle a analizar su plan de tratamiento con su gastroenterólogo

El manejo de los síntomas de la enfermedad de Crohn puede ser desafiante, en especial cuando se presentan evacuaciones frecuentes y dolor abdominal. Pero, llevar una conversación detallada con su médico respecto al Crohn puede ser útil. Complete esta herramienta de diálogo sobre el tratamiento y así podrá prepararse para conversar con su médico respecto a:

- Los síntomas que está presentando
- Cómo le está afectando la enfermedad de Crohn
- Cómo está funcionando su tratamiento actual
- Las opciones de tratamiento

## Para guiar su conversación, seleccione sus respuestas:

1

**¿Cuál es el tratamiento actual que recibe para su enfermedad de Crohn de moderada a severa? (Seleccione todas las que aplican.)**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bloqueador del TNF, como HUMIRA® o REMICADE® | <input type="checkbox"/> Otro biológico | <input type="checkbox"/> Esteroides                        |
| <input type="checkbox"/> Inmunomodulador (como azatioprina)           | <input type="checkbox"/> Antibióticos   | <input type="checkbox"/> Actualmente no recibe tratamiento |
| <input type="checkbox"/> Otro: _____                                  |   |  |

REMICADE® (infliximab) es una marca comercial registrada de Janssen Biotech, Inc.

**Vea las preguntas en la próxima página**

## USO

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con la enfermedad de Crohn de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del TNF se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con la enfermedad de Crohn.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**

**2****Actualmente, ¿presenta alguno de los siguientes síntomas?**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Cansancio       | <input type="checkbox"/> Evacuaciones frecuentes               |
| <input type="checkbox"/> Dolor abdominal | <input type="checkbox"/> Otros síntomas de Crohn no enumerados |

**3****Si presenta evacuaciones frecuentes con su plan de tratamiento actual, ¿cuántas veces al día ocurren estas?**

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0 a 3 | <input type="checkbox"/> 7 a 9    |
| <input type="checkbox"/> 4 a 6 | <input type="checkbox"/> 10 o más |

Si ha cambiado su rutina debido a las evacuaciones frecuentes, esto puede ser señal de que la enfermedad de Crohn se encuentra activa.

**¿Son ahora sus evacuaciones más o menos frecuentes desde su última visita médica?**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Más frecuentes | <input type="checkbox"/> Menos frecuentes | <input type="checkbox"/> Permanecen igual |
|---|---|---|

Si sus evacuaciones son más frecuentes, esto pudiera significar que ha habido un cambio en su padecimiento. Asegúrese de mencionárselo a su médico.

**4****Si está presentando dolor abdominal, ¿cómo describe la intensidad?**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Intolerable  | <input type="checkbox"/> Un poco incómodo       |
| <input type="checkbox"/> Muy incómodo | <input type="checkbox"/> Ningún dolor/no aplica |

El dolor abdominal es un síntoma común de la enfermedad de Crohn; presentar síntomas o cambios en sus síntomas son señales que pueden ayudar a su médico a evaluar su plan de tratamiento.

**Vea las preguntas en la próxima página**

## **USO**

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con la enfermedad de Crohn de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del TNF se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con la enfermedad de Crohn.

## **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**



Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 6-8. Consulte la **Información de Prescripción Completa**, incluyendo la **Guía del Medicamento**, para RINVOQ en [rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_spa.pdf](http://rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf) y analícela con su médico.

**5**

**En los pasados 3 meses, ¿ha hecho cambios en su dieta o comenzado a evitar determinados alimentos o comidas con su plan de tratamiento actual?**

 Sí

 No/no aplica

Si ha hecho alteraciones en su dieta para tratar de manejar los brotes de la enfermedad de Crohn, esto pudiera indicar un cambio en su padecimiento. Así que, aunque los cambios en su apetito o dieta sean pocos, es aconsejable mencionárselos a su médico para saber si es necesario hacer cambios a su plan de tratamiento.

**6**

**En general, ¿cómo afecta la enfermedad de Crohn su diario vivir? (Seleccione todas las que aplican.)**

- Tengo que estar listo para los múltiples viajes al baño cuando salgo de la casa
- Tengo que faltar al trabajo o a la escuela
- Siento como si no estuviera disponible para mi familia y amigos
- Evito salir a comer con otros
- Siento mucho cansancio para poder hacer diligencias, ver a otros y concentrarme en el trabajo
- Cancelo mis planes porque me preocupan las evacuaciones frecuentes
- Otros: \_\_\_\_\_

**Vea las preguntas en la próxima página**

## **USO**

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con la enfermedad de Crohn de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del TNF se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con la enfermedad de Crohn.

## **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

**RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:**

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**



Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 6-8. Consulte la **Información de Prescripción Completa**, incluyendo la **Guía del Medicamento**, para RINVOQ en [rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_spa.pdf](http://rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf) y analícela con su médico.

7

¿Conoce cómo la inflamación contribuye a sus síntomas de Crohn?

Sí

No

Un poco

La inflamación es parte normal de la defensa del cuerpo contra lesiones o infecciones causadas por bacterias, hongos y virus. Pero, en la enfermedad de Crohn, el sistema inmunitario se torna hiperactivo y ataca el tracto gastrointestinal, lo que provoca un ciclo de más inflamación, síntomas y daño al tracto gastrointestinal.

8

¿Le ha hablado su médico respecto a los resultados de sus endoscopias o la condición en que se encuentra su tracto gastrointestinal?

Sí

No

Un sistema inmunitario hiperactivo puede causar inflamación del tracto gastrointestinal y contribuir a los síntomas de Crohn. Reducir la inflamación del Crohn puede ayudar a una mejora visible del tracto gastrointestinal.

9

¿Con qué frecuencia usa esteroides para ayudar a controlar los síntomas de la enfermedad de Crohn?

A menudo

A veces

Nunca/  
no aplica

10

Actualmente, ¿se encuentra en remisión sin usar esteroides?

Sí

No

No está seguro

Es importante que su médico sepa cómo se siente con su tratamiento actual. Converse con su gastroenterólogo respecto a cómo puede ser la remisión sin el uso de esteroides y lo que esto representaría para usted.

Vea las preguntas en la próxima página

## USO

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con la enfermedad de Crohn de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del TNF se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con la enfermedad de Crohn.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**



Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 6-8. Consulte la Información de Prescripción Completa, incluyendo la Guía del Medicamento, para RINVOQ en [rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_spa.pdf](http://rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf) y analícela con su médico.

**11**

**¿Se encuentra listo para conversar con su gastroenterólogo respecto a una opción de tratamiento que va más allá del alivio de los síntomas para tratar la inflamación excesiva que puede contribuir a los síntomas de Crohn?**

Sí

No

Me gustaría poder conversar más con mi médico

Siendo proactivo en las conversaciones con su médico podrá identificar un plan de tratamiento que le ayude a lograr sus objetivos.



**Analice las respuestas con su gastroenterólogo y pregunte si RINVOQ es adecuado para usted.**



**¿Necesita ayuda para encontrar a un gastroenterólogo?**

Haga clic [aquí](#) o escanee el código QR para encontrar a un médico en su área.

## **USO**

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con la enfermedad de Crohn de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del TNF se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con la enfermedad de Crohn.

## **CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD**

RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir la capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido infecciones graves, en ocasiones mortales, incluidas tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus.
- **Aumento en el riesgo de muerte en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** Aumento del riesgo de algunos cánceres, incluidos linfoma y cáncer de la piel. Las personas que actualmente fuman o han fumado en el pasado corren un riesgo mayor de linfoma y cáncer de pulmón.
- **Aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares importantes, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca, en especial si actualmente fuman o han fumado en el pasado.**
- **Coágulos sanguíneos,** algunos mortales, en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias. Esto ha ocurrido con más frecuencia en personas mayores de 50 años con al menos 1 factor de riesgo de enfermedad cardíaca.
- **Reacciones alérgicas graves. No lo tome si ha presentado alergia a RINVOQ o a sus ingredientes.**
- **Desgarres en el estómago o los intestinos; cambios en resultados de pruebas de laboratorio específicas.**



Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en las páginas 6-8. Consulte la **Información de Prescripción Completa**, incluyendo la **Guía del Medicamento**, para RINVOQ en [rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_spa.pdf](http://rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf) y analícela con su médico.

# USO

RINVOQ es un medicamento recetado usado para tratar a adultos con la enfermedad de Crohn de moderada a severa cuando 1 o más medicamentos conocidos como bloqueadores del TNF se han usado y no funcionaron bien o no pueden tolerarse. No se conoce si RINVOQ es seguro y eficaz en niños con la enfermedad de Crohn.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre RINVOQ?

#### RINVOQ puede causar efectos secundarios graves, tales como:

- **Infecciones graves.** RINVOQ puede reducir su capacidad para combatir infecciones. Durante el tratamiento con RINVOQ se han producido infecciones graves, tales como tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que pueden diseminarse por todo el cuerpo. Algunas personas murieron debido a estas infecciones. Su proveedor de atención médica deberá hacerle un análisis para determinar si tiene TB antes de que usted comience su tratamiento con RINVOQ, y mantenerle bajo observación estrecha para detectar signos y síntomas de TB en el transcurso del tratamiento con RINVOQ. No deberá comenzar a tomar RINVOQ si tiene algún tipo de infección, a menos que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo. Si usted contrae una infección grave, su proveedor de atención médica podría suspenderle el tratamiento con RINVOQ hasta que la infección esté bajo control. Quizás corra un mayor riesgo de presentar culebrilla (herpes zóster).
- **Un aumento del riesgo de muerte en personas mayores de 50 años que tengan por lo menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).**
- **Cáncer y problemas del sistema inmunitario.** RINVOQ podría aumentar el riesgo de presentar determinados cánceres, tales como linfoma y cánceres de la piel (entre otros). Los fumadores o exfumadores corren un mayor riesgo de presentar determinados tipos de cáncer, tales como linfoma y cáncer de pulmón. Siga las recomendaciones que le dé su proveedor de atención médica en cuanto a hacerse revisar la piel para detectar cáncer de la piel durante su tratamiento con RINVOQ. Limite la cantidad de tiempo que permanezca expuesto a la luz solar. Cuando esté expuesto a la luz solar, póngase indumentaria protectora y aplíquese filtro solar.
- **Un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares (CV) graves, tales como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte en personas mayores de 50 años que tengan al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular), especialmente en fumadores o exfumadores.**



- **Coágulos sanguíneos.** Con RINVOQ pueden producirse coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones y las arterias, los cuales podrían ser potencialmente mortales e incluso causar la muerte. Los coágulos de sangre en las venas de las piernas y los pulmones se han presentado con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años que tienen al menos 1 factor de riesgo de cardiopatía (enfermedad cardiovascular).
- **Reacciones alérgicas.** En personas que tomaban RINVOQ se han observado síntomas como ronchas (urticaria); dificultad para respirar; desmayos; mareos, o hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, que podrían indicar que se está produciendo una reacción alérgica. Algunas de estas reacciones fueron graves. Si presenta cualquiera de estos síntomas durante el tratamiento con RINVOQ, deje de tomar RINVOQ y busque atención médica de emergencia inmediatamente.
- **Desgarros en el estómago o los intestinos.** Esto ocurre más a menudo en personas que toman antiinflamatorios no esteroideos (AINE) o corticoesteroides. Obtenga atención médica de inmediato si tiene dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos.
- **Alteraciones de algunos análisis clínicos.** Su proveedor de atención médica deberá hacerle análisis de sangre antes de que usted comience a tomar RINVOQ y durante su tratamiento. Su proveedor de atención médica podría interrumpir su tratamiento con RINVOQ por cierto tiempo, si es necesario a causa de los cambios de los resultados de estos análisis de sangre.

#### No tome RINVOQ si le tiene alergia al upadacitinib o a cualquiera de los componentes de RINVOQ.

Encontrará una lista completa de los componentes en la Guía del medicamento o el Resumen breve para el consumidor.

### ¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica ANTES de comenzar a tomar RINVOQ?

Informe a su proveedor de atención médica si:

- está recibiendo tratamiento por una infección, tiene una infección que no desaparece o que le sigue reapareciendo o tiene síntomas de infección, tales como:
  - Fiebre, sudores o escalofríos
  - Falta de aliento
  - Enrojecimiento, calor o dolor de la piel, o llagas en el cuerpo
  - Dolores musculares
  - Cansancio
  - Sangre en las flemas
  - Diarrea o dolor de estómago
  - Tos
  - Pérdida de peso
  - Ardor al orinar o necesidad de orinar con mayor frecuencia de la normal

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## (continuación de la página anterior)

- Tiene TB o ha estado en contacto estrecho con una persona que la tenga.
- Es fumador o exfumador.
- Ha tenido un infarto de miocardio, otros problemas cardíacos o un accidente cerebrovascular.
- Ha tenido o tiene cualquier tipo de cáncer, hepatitis B o C, culebrilla (herpes zóster), coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones, diverticulitis (inflamación en partes del intestino grueso) o úlceras en el estómago o los intestinos.
- Tiene otras afecciones médicas, tales como problemas del hígado, bajas cifras de glóbulos sanguíneos, diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, el VIH o el sistema inmunitario debilitado.
- Vive o ha vivido en (o viajado a) partes de Estados Unidos, como los valles de los ríos Ohio y Mississippi y el Suroeste del país, en que el riesgo de contraer ciertos tipos de infecciones por hongos es mayor. Si no sabe con certeza si ha estado en estos tipos de regiones, pregúnteselo a su proveedor de atención médica.
- Recibió recientemente una vacuna o tiene programado recibir alguna. Las personas que tomen RINVOQ no deberán recibir vacunas elaboradas con microbios vivos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Los estudios en animales indican que RINVOQ podría perjudicar al bebé en gestación. Su proveedor de atención médica determinará si usted está embarazada o no antes de que comience a tomar RINVOQ. Use métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo mientras tome RINVOQ y durante 4 semanas después de su última dosis.
- Hay un programa de vigilancia del embarazo para RINVOQ. Este programa tiene la finalidad de recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Si usted queda embarazada durante su tratamiento con RINVOQ, se recomienda informe del embarazo llamando al 1-800-633-9110.
- Está amamantando o tiene intenciones de amamantar. RINVOQ podría pasar a la leche materna humana. No amamante durante el tratamiento con RINVOQ ni durante los 6 días posteriores a su última dosis.

**Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que use,** incluidos los de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. RINVOQ y otros medicamentos pueden reaccionar entre sí y dar lugar a efectos secundarios.

### Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:

- Medicamentos para infecciones por hongos o bacterias
  - Rifampicina o fenitoína
  - Medicamentos que afectan el sistema inmunitario
- Si no sabe con certeza si ha está tomando alguno de estos



medicamentos, pregúnteselo a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

### ¿Qué debería evitar mientras use RINVOQ?

Durante el tratamiento con RINVOQ deberá evitar los alimentos y las bebidas que contengan jugo de toronja (pomelo), ya que su consumo podría aumentar el riesgo de que se produzcan efectos secundarios.

### ¿Qué debo hacer o decirle a mi proveedor de atención médica DESPUÉS de comenzar a tomar RINVOQ?

- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de infección. El tratamiento con RINVOQ puede aumentar su propensión a contraer infecciones o empeorar infecciones que ya tenga.
- Busque atención de emergencia inmediatamente si tiene algún síntoma de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular mientras tome RINVOQ, incluidos:
  - Molestias en la zona central del pecho que duren más de unos minutos o que desaparezcan y vuelvan a aparecer
  - Opresión, dolor, tensión o pesadez intensos en el pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula
  - Dolor o molestias en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago
  - Falta de aliento, con o sin molestias en el pecho
  - Sudores fríos repentinos
  - Náuseas o vómitos
  - Sensación de mareo
  - Debilidad en una parte o un lado del cuerpo
  - Habla arrastrada
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si durante el tratamiento con RINVOQ presenta cualquier signo o síntoma de coágulos de sangre; por ejemplo:

- Hinchazón	- Dolor	de la espalda
- Dolor o sensibilidad en una o ambas piernas	repentino y sin explicación en el pecho o la parte superior	- Falta de aliento o dificultad para respirar
- Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si tiene fiebre o dolor abdominal persistente y algún cambio en sus hábitos intestinales.

### ¿Cuáles son otros efectos secundarios posibles de RINVOQ?

Entre los efectos secundarios frecuentes figuran: infecciones de las vías respiratorias superiores (resfriado común, sinusitis); culebrilla (herpes zóster); infecciones por el virus del herpes simple (incluidos fuegos labiales);

bronquitis; náuseas; tos; fiebre; acné; dolor de cabeza; aumento de los niveles sanguíneos de creatina fosfocinasa; reacciones alérgicas; inflamación de los folículos pilosos; dolor abdominal (zona del estómago); aumento de peso; gripe; cansancio; cifras bajas de determinados tipos de glóbulos blancos (neutropenia, linfopenia, leucopenia); dolor muscular; enfermedad seudogripal; sarpullido; aumento de los niveles sanguíneos de colesterol; aumento de los niveles de enzimas hepáticas; neumonía; cifras bajas de glóbulos rojos (anemia), e infección del estómago y el intestino (gastroenteritis).

Ha habido casos de separación o desgarro de la parte posterior del ojo (desprendimiento de retina) en personas con dermatitis atópica tratadas con RINVOQ. Llame de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene cambios repentinos de la visión durante el tratamiento con RINVOQ.

Puede que algunas personas que toman RINVOQ vean residuos del medicamento (un comprimido entero o en fragmentos) en las heces; si esto le sucede, llame a su proveedor de atención médica.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles de RINVOQ.

### **¿Cómo debo usar RINVOQ?**

RINVOQ se toma una vez al día con o sin alimentos. No parta, triture ni mastique el comprimido. Tome RINVOQ exactamente según las indicaciones de su proveedor de atención médica. RINVOQ está disponible en comprimidos de liberación prolongada de 15 mg, 30 mg y 45 mg.

**Esta es la información más importante que debe conocer sobre RINVOQ. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica.**

**Se le aconseja notificar a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta.**

**Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.**

**Si tiene dificultades para pagar su medicamento, AbbVie podría ayudarle. Visite [AbbVie.com/myAbbVieAssist](http://AbbVie.com/myAbbVieAssist) para obtener más información.**

**Consulte la [Información de Prescripción Completa](#), incluyendo la [Guía del Medicamento](#), para RINVOQ en [rxabbvie.com/pdf/rinvoq\\_pi\\_spa.pdf](http://rxabbvie.com/pdf/rinvoq_pi_spa.pdf) y analízala con su médico.**